استوب فالي

مبيـــدات الأعشـــــاب

وادي الصفوة الزراعية
WADI ALSAFOH

■ المادة الفعالة

بيندامثلين 33%

Pendimethalin 33%

■ خواص المبيد:



مبيد أعشاب اختياري ويستخدم قبل الإنبات لمكافحة نمو بذور الحشائش الحولية رفيعة وعريضة الأوراق كما يمكن مكافحـــة الحشائـــــش وهي صغيرة فـــي طور البادرات (1- 1.5) ورقـــة للحشائـش الحولية الرفيعة و (2-3) أوراق للحشائش العريضة.

معدل وطريقة الإستعمال

المحصول	معدل الإستخدام	الأعشاب	ملاحظـــــات	فترة التحريم
القمح والشعير	3.8 - 4.5 لتر/ هكتار	الأعشاب (الحشائش) الرفيعة أبو ركبة (دنيبة) ثمام - هيبان - لزيق - حلبان - دفرة - سميحا - عقرش - وأبيرا الأعشاب (الحشائش) العريضة قطيفة (عرف الديك) - عين القط اتربلكس - كيس الراعي كاردمينا - الزريبج ام اللبن - شتراج - رمرام جاليوم - لسان الحمر قرطاب - الرجلة (صغيرة) الخردل البري الحراقة واللويش	يستخدم في الأراضي الثقيلة قبل الإنبات. وفي الأراضي الرملية مباشرة بعد الإنبات، بحيث لا يتعدى نمو الحشائش عن 1.5 - 2 ورقة والبذور بعمق 3 - 5 سم	21 يوم
البرسيم	3 - 4.5 لتر/ هكتار		يستخدم بعد الانبات بعد بلوغ المحصول مرحلة 3 ورقات حقيقة بعد الحش ويجب تفادي الرش أثناء ساعات النهار الحار.	21 يوم
البطاطس	3.8 - 6 لتر/ هكتار		يستخدم قبل 7 أيام من إنبات محصول البطاطس وأفضل وقت مباشرة بعد عملية الترديم.	21 يوم
البصل - الثوم الكرات	3.8 - 5.3 لتر/ هكتار		يستخدم قبل الإنبات وفي خلال 4 ايام من الزراعة وتعمق البذور إلى 3 سم. أو بعد الإنبات أو الشتل وبعد وصول النبات إلى طور ورقة كاملة ويمكن إعادة المعاملة بعد 60 يوم	21 يوم
الخضار	3 - 6 لتر/ هكتار		قبل نقل الاشتال	21 يوم
الجزر	3.8 - 4.5 لتر/ هكتار		قبل وبعد الإنبات البذر بعمق 3 سم	21 يوم
بساتين الفاكهة والعنب	3 - 6 لتر/ هكتار		يرش المبيد قبل ظهور البراعم وفي حال وجود أعشاب نامية تحت الاشجار.	ــــــــ

www.alsafoah.com info@alsafoah.com