ايموشن

المبيـــدات الفطـريـة

وادي الصفوة الزراعية
WADI ALSAFOH

المادة الفعالة

بروباموكارب هيدروكلوريد 72,2٪

Propamocarb hydrochloride %72.2



خواص المبيد:

مبيد فطري جهازي ووقائي وعلاجي فعال ضد أمراض البياض الزغبي وعفن الجذور، يتميز بسرعة امتصاصه وانتقاله داخل النبات مما يوفر حماية متجانسة للنموات الحديثة، يمنع إنبات الجراثيم الفطرية ويوقف تطور الميسليوم، ويوفر فترة حماية طويلة

معدل وطريقة الإستعمال

المحصول	الآفات الفطرية	معدل الإستخدام	فترة التحريم
الخضروات الفلفل الحلو الطماطم البصل الخس السبانخ الخيار	عفـــن الجذور البيثيـــــوم الفيتوفثـــورا البياض الزغبي	معاملة البذور : بعد زراعة البذور يرش محلول المبيد فوق سطح التربة بمعدل 100مل/ 100 لتر ماء بمعدل 5 لتر من المحلول/ م2. معاملة الأشتال: قبل زراعة اشتال الخضروات 2-4 أيام يرش محلول المبيد بنفس المعدل السابق على سطح التربة ثم تزرع الأشتال. سقى الأشتال بعد 5 أيام من الزراعة، يوضع 100 مل من المبيد لكل 100 لتر ماء بمعدل100 - 150 مل من المحلول شتلة وتكرر العملية كل أسبوعين حسب الضرورة. الرش على الأوراق يرش المبيد بمعدل 150 - 300 مل / 100 لتر ماء. عند بداية الإصابة ويكرر الرش كل 7- 10 أيام. على ألا يتعدى عدد الرشات عن 4 رشات في الموسم.	14 يوم بأستثناء الخس : 21 يوم الخيار 4 أيام
نباتات الزينة	عفـــن الجذور البيثيـــــوم الفيتوفثـــورا البياض الزغبي	معاملة البذور ترش التربة بمعدل 5-10 مل/ م2 في 1-5 لتر ماء حسب درجة رطوبة التربة. معاملة التربة قبل الشتل ترش التربة بمعدل 10-15 مل من المبيد/ م2 في 1-5 لتر ماء حسب درجة رطوبة التربة. معاملة العقل قبل القطع: يرش النبات العقل) بمعدل 10-15 مل/1م2 في 1-5 لتر ماء.	----------

www.alsafoah.com info@alsafoah.com